

PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

Mastodynon N geriamieji lašai, tirpalas

Agnus castus/ Caulophyllum thalictroides/ Cyclamen/ Ignatia/, Iris/ Lilium tigrinum

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.

Mastodynon N galima įsigyti be recepto, tačiau jį reikia vartoti tiksliai, kaip nurodyta, kad poveikis būtų geriausias.

- Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
- Jeigu norite sužinoti daugiau arba pasitarti, kreipkitės į vaistininką.
- Jeigu simptomai pasunkėjo arba nepalengvėjo, kreipkitės į gydytoją.
- Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Lapelio turinys

1. Kas yra Mastodynon N ir kam jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant Mastodynon N
3. Kaip vartoti Mastodynon N
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti Mastodynon N
6. Kita informacija

1. KAS YRA MASTODYNON N IR KAM JIS VARTOJAMAS

Mastodynon N geriamieji lašai yra homeopatinis preparatas, vartojamas mastodinijai, fibrocitinei mastopatijai, premenstruaciniam sindromui, dėl *Corpus Luteum* - nepakankamumo sukeltų mėnesinių ciklo sutrikimų, menstruacinio pobūdžio migrenai gydyti.

2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT MASTODYNON N

Mastodynon N vartoti negalima:

- jei yra padidėjęs jautrumas *Agnus castus* ir/arba *Caulophyllum thalictroides* ir/arba *Cyclamen* ir/arba *Ignatia* ir/arba *Iris* ir/arba *Lilium tigrinum*.
- Mastodynon N netinka piktybiniais krūtų susirgimams gydyti.
- jei sergate alkoholizmu ar kepenų ligomis prieš vartojant vaistą būtina pasitarti su gydytoju, kadangi preparato sudėtyje yra alkoholio.

Kitų vaistų vartojimas

Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Sąveika su kitais vaistais nežinoma.

Mastodynon N vartojimas su maistu ir gėrimais

Vartojant homeopatinčius vaistus nepalankų poveikį daro kenksmingi įpročiai, alkoholio, kavos ir tabako vartojimas.

Nėštumo ir žindymo laikotarpis

Prieš vartojant bet kokį vaistą būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

Jei vartojant Mastodynon N pastojama, tęsti gydymo kursą nepatariama. Nėštumo metu Mastodynon N lašų vartoti negalima, kadangi jo poveikis nėščioms moterims gerai neištirtas.

Vaistas netinka ir krūtimi maitinančioms moterims, kadangi tyrimų su gyvūnais metu nustatyta, kad sumažėja motinos pieno gamyba.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Preparato sudėtyje yra 53 % [v/v] etanolio. Vienkartinėje vaisto dozėje yra maždaug 0,5 g etanolio, kuris normalios medžiagų apykaitos ir svorio žmogaus organizme greitai suardomas, todėl įtakos eismo dalyviui ar mašinos operatoriui neturėtų daryti.

Svarbi informacija apie kai kurias pagalbines Mastodynon N medžiagas

Preparato sudėtyje yra 53 % (v/v) etanolio (alkoholio), t. y. yra maždaug 0,5 g etanolio dozėje. Šis kiekis atitinka 12,7 ml alaus arba 5,3 ml vyno.

Kenksmingas sergantiems alkoholizmu.

Būtina atsižvelgti nėščiosioms, žindyvėms, vaikams ir didelės rizikos grupės (pvz., sergantiems kepenų ligomis ar epilepsija) pacientams. .

3. KAIP VARTOTI MASTODYNON N

Mastodynon N lašus visada vartokite kaip nurodyta pakuotės lapelyje. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Įprastinė dozė yra:

Gerti 30 lašų 2 kartus per dieną ryte ir vakare, praskiedus trupučiu vandens arba kitais skysčiais.

Lašinant vaistą, buteliuką laikykite vertikaliai.

Mastodynon N lašus vartoti mažiausiai 3 mėnesius, taip pat ir mėnesinių metu. Paprastai pagerėjimas pastebimas po 6 savaičių. Jei nutraukus gydymą simptomai vėl atsiranda, reikėtų pasikonsultuoti su gydytoju ir gydymą tęsti.

Kadangi vaistas gerai toleruojamas, jį galima skirti ilgalaikiam gydymui.

Pastaba. Jei nusiskundimai truktų ilgesnį laiką, būtų neaiškūs ar atsirastų naujų, būtina pasikonsultuoti su gydytoju, nes tai gali būti rimtos ligos požymiai, kai reikia skirti gydymo kursą

Pavartojus per didelę Mastodynon N dozę

Perdozavus vaisto, ypač jei tai atsitinka vaikams, galima apsinuodyti alkoholiu. Tuomet iškyla pavojus gyvybei, todėl būtina kviesti gydytoją. Viename 50 ml talpos buteliuke yra 20,9 g etanolio, o 100 ml talpos buteliuke 41,8 g etanolio.

Pamiršus pavartoti Mastodynon N

Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę.

Nustojus vartoti Mastodynon N

Jei kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

Mastodynon N, kaip ir visi kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Gali pasitaikyti tokių šalutinių poveikių kaip pykinimas, vėmimas, gali padidėti svoris, išberti odą, niežėti, išberti spuogai, skaudėti galvą. Jei augaliniame vaiste yra *Agnus castus*, pavieniais atvejais gali pasireikšti psichomotorinis susijaudinimas, sutrikimas ar haliucinacijos.

Jei pastebėsite šalutinį poveikį, kuris neaprašytas šiame informaciniame lapelyje, prašom apie tai informuoti gydytoją ar vaistininką.

Pastaba. Pradėjus gerti homeopatinį vaistą, kartais gali pablogėti savijauta (pirminis pablogėjimas). Tuomet vaisto vartojimą reikia nutraukti ir pasikonsultuoti su gydytoju.

Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui ar vaistininkui.

5. KAIP LAIKYTI MASTODYNON N

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Atidarius buteliuką pirmą kartą tinka vartoti 6 mėnesius.

Ant etiketės ir dėžutės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, Mastodynon N vartoti negalima. Vaistas tinka vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Laikant ilgesnį laiką, vaistas gali susidrumsti ar gali iškristi nuosėdos, bet tai vaisto gydomųjų savybių nekeičia.

KITA INFORMACIJA

Mastodynon N sudėtis

- Veikliosios medžiagos yra:

1g (1,08 ml) Mastodynon N lašų yra:

Agnus castus D1 0,2 g

Caulophyllum thalictroides D4 0,1 g

Cyclamen D4 0,1 g

Ignatia D6 0,1 g

Iris D2 0,2 g

Lilium tigrinum D3 0,1 g

- Kitos pagalbinės medžiagos yra;

0,1 g 15% etanolio, 0,1 g 43% etanolio. Preparato sudėtyje yra 53 % (v/v) etanolio.

Mastodynon N išvaizda ir kiekis pakuotėje

Skaidrūs, gelsvi geriamieji lašai, pakuotėse po 50 ml ir 100 ml.

Pastaba. Diabetikai gali šį vaistą vartoti be apribojimų, nes vienkartinėje vaisto dozėje yra mažiau nei 0,03 duonos vienetų (DV).

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas

BIONORICA AG

Kerschensteinerstrasse 11-15

D-92318 Neumarkt

Vokietija
Tel.: 00 49-9181-23190
Faksas: 00 49-9181-231265

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.

Lietuvos ir Vokietijos UAB
“Kauno medicinos centras”
Šiaures pr. 8a
LT- 49155 Kaunas
Lietuva
Tel: 8 37 38 68 30

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2008-04-25

Naujausia pakuotės lapelio redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) tinklalapyje <http://www.vvkt.lt/>