

## PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

### Bronchipret TP plėvele dengtos tabletės

Vaistinių čiobrelių žolės sausasis ekstraktas/ raktažolių šaknų sausasis ekstraktas

#### **Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.**

Bronchipret galima įsigyti be recepto, tačiau jį reikia vartoti tiksliai, kaip nurodyta, kad poveikis būtų geriausias.

- Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
- Jeigu norite sužinoti daugiau arba pasitarti, kreipkitės į vaistininką.
- Jeigu simptomai pasunkėjo arba per 14 dienų nepalengvėjo, kreipkitės į gydytoją.
- Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

#### **Lapelio turinys**

1. Kas yra Bronchipret TP ir kam jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant Bronchipret TP
3. Kaip vartoti Bronchipret TP
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti Bronchipret TP
6. Kita informacija

### **1. KAS YRA BRONCHIPRET TP IR KAM JIS VARTOJAMAS**

Vaistas skirtas ūminio bronchito sukulto produktyvaus kosulio gydymui, atsikosėjimo gerinimui.

### **2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT BRONCHIPRET TP**

#### **Bronchipret TP vartoti negalima:**

- jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) raktažolėms, čiobreliams ar kitiems notrelinių (lūpažiedžių) *Lamiaceae (Labiatae)* šeimos augalams, beržams, kiečiams, salierams arba kitoms preparato sudedamosioms dalims.

#### **Specialios atsargumo priemonės**

Jaunesniems kaip 12 metų vaikams Bronchipret TP tablečių vartoti nerekomenduojama.

#### **Kitų vaistų vartojimas**

Sąveika su kitais vaistais nežinoma.

Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

#### **Bronchipret TP vartojimas su maistu ir gėrimais**

Duomenų nėra.

#### **Nėštumas ir žindymo laikotarpis**

Duomenų apie šio preparato saugumą, vartojant nėštumo ir žindymo laikotarpiu nepakanka.

**Bronchipret TP** vartoti šiuo laikotarpiu nerekomenduojama.

Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

#### **Vairavimas ir mechanizmų valdymas**

Specialių atsargumo priemonių nereikia.

### **Svarbi informacija apie kai kurias pagalbines Bronchipret TP medžiagas**

Šio vaistinio preparato sudėtyje yra gliukozės ir laktozės. Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą.

### ***Papildoma informacija***

Pastaba diabetu sergantiems žmonėms

Vienoje Bronchipret TP plėvele dengtoje tabletėje yra vidutiniškai 0,02 skaičiuojamų angliavandenių vieneto.

## **3. KAIP VARTOTI BRONCHIPRET TP**

Bronchipret TP tabletes visada vartokite tiksliai, kaip nurodyta pakuotės lapelyje. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Jeigu gydytojas nepaskyrė vartoti kitaip, įprastinė dozė suaugusiems žmonėms ir vyresniems nei 12 metų paaugliams – gerti po 1 tabletę 3 kartus per parą.

Bronchipret TP tabletes nuryti nesukramtytas prieš valgį, užgeriant pakankamu kiekiu skysčio (geriausia stikline vandens).

### ***Kiek laiko vartoti Bronchipret TP***

Gydymo trukmė priklauso nuo ligos eigos. Bet koku atveju atkreipkite dėmesį į informaciją skyriuje „Kas žinotina prieš vartojant Bronchipret TP“.

### **Pavartojus per didelę Bronchipret TP dozę**

Iki šiol nėra pranešimų apie čiobrelių žolės ir raktažolių šaknų preparatų perdozavimo atvejus. Jeigu išgėrėte labai daug tablečių gali prasidėti pilvo skausmai, vėmimas ir viduriavimas. Tokiu atveju praneškite gydytojui. Jis nuspręs, kokių priemonių reikia imtis.

### **Pamiršus pavartoti Bronchipret TP**

Jeigu išgėrėte per mažai Bronchipret TP tablečių arba pamiršote jų išgerti, vėliau dvigubos dozės vartoti negalima. Toliau vartokite vaistą, kaip paskyrė gydytojas arba kaip nurodyta pakuotės lapelyje.

### **Nustojus vartoti Bronchipret TP**

Nutraukti tablečių vartojimą nėra žalinga.

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

## **4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS**

Bronchipret TP, kaip ir visi kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Apibūdinant šalutinius poveikius vartojamos toliau išvardytos dažnio kategorijos:

Labai dažni	Dažniau nei 1 pacientui iš 10
Dažni	Nuo 1 iki 10 pacientų iš 100
Nedažni	Nuo 1 iki 10 pacientų iš 1000
Reti	Nuo 1 iki 10 pacientų iš 10 000
Labai reti	Rečiau nei 1 pacientui iš 10 000

### **Galimas šalutinis poveikis**

Padidėjusio jautrumo reakcijos, pvz., dusulys, odos bėrimas, dilgėlinė ar veido, burnos ir/ar gerklės patinimas, yra labai retos. Virškinimo trakto sutrikimai, pvz., diegliai, pykinimas, vėmimas ir viduriavimas, yra nedažni.

Jeigu pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui. Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, nevartokite Bronchipret TP tablečių ir kreipkitės į gydytoją. Jis įvertins sunkumo laipsnį ir nuspręs, ar reikia imtis kokių nors priemonių.

Atsiradus pirmųjų padidėjusio jautrumo reakcijos požymių, Bronchipret TP tablečių nebevartokite. Jeigu pastebėjote bet kokią šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

## **5. KAIP LAIKYTI BRONCHIPRET TP**

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos ir drėgmės.

Ant dėžutės po Tinka iki ar lizdinės plokštelės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, Bronchipret TP vartoti negalima. Vaistas tinka vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

## **6. KITA INFORMACIJA**

### **Bronchipret TP sudėtis**

- Veikliosios medžiagos:  
Vienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 60 mg *Primula veris* L. Ir (ar) *Primula elatior* (L.) Hill., radix (raktažolių šaknų) sausojo ekstrakto (5,3–7,8:1); ekstrakcijos tirpiklis 47,4 % (V/V) etanolis; 160 mg *Thymus vulgaris* L. ir (ar) *Thymus zygis* L., herba (vaistinių čiobrelių žolės) sausojo ekstrakto (4–8:1); ekstrakcijos tirpiklis 70 % (V/V) etanolis.
- Pagalbinės medžiagos:  
chlorofilinas a – kompleksinė vario trinatrio druska (E 141), krospovidonas, dimetikonas, skystoji gliukozė, koloidinis silicio dioksidas, bevandenis, hipromeliozė, laktozės monohidratas, magnio stearatas, mikrokristalinė celiuliozė, pipirinių mėtų skonio medžiaga, poliakrilato 30 % dispersija, povidonas K25, propilenglikolis, riboflavinai (E 101), sacharino natrio druska, talkas, titano dioksidas (E 171).

### **Bronchipret TP išvaizda ir kiekis pakuotėje**

Plėvele dengtos tabletės yra žalios spalvos, apvalios, abipus išgaubtos, bukais kraštais. Pakuotėse yra po 20, 50 arba 100 tablečių.

## **Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas**

BIONORICA SE  
Kerschensteinerstrasse 11-15  
92318 Neumarkt  
Vokietija  
Tel. +49 9181 / 231-90  
Faks. +49 9181 / 231-265  
Interneto svetainė [www.bionorica.de](http://www.bionorica.de)  
El. paštas [info@bionorica.de](mailto:info@bionorica.de)

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.

Lietuvos ir Vokietijos UAB  
„Kauno medicinos centras“  
Šiaurės pr. 8A  
LT-49155 Kaunas, Lietuva  
Tel. +370 37 38 68 30

**Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2010-09-08**

Naujausia pakuotės lapelio redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) interneto svetainėje <http://www.vvkt.lt/>