

## PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

### Canephron dengtos tabletės

Širdažolių žolė, gelsvių šaknys, rozmarinų lapai

#### **Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.**

Canephron galima įsigyti be recepto, tačiau jį reikia vartoti tiksliai, kaip nurodyta, kad poveikis būtų geriausias.

- Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
- Jeigu norite sužinoti daugiau arba pasitarti, kreipkitės į vaistininką.
- Jeigu simptomai pasunkėjo arba per 7 dienas nepalengvėjo, kreipkitės į gydytoją.
- Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

#### **Lapelio turinys**

1. Kas yra Canephron ir kam jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant Canephron
3. Kaip vartoti Canephron
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti Canephron
6. Kita informacija

### **1. KAS YRA CANEPHRON IR KAM JIS VARTOJAMAS**

Canephron dengtos tabletės yra tradicinis augalinis preparatas.

Canephron yra skirtas lengviems apatinių šlapimo takų uždegimo sukeltiems negalavimams gydyti, o taip pat inkstų akmenų susidarymo profilaktikai.

Canephron turėtų būti vartojamas palaikomajam gydymui kartu su gydytojo paskirtomis specifinėmis gydymo priemonėmis.

Tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu.

### **2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT CANEPHRON**

Canephron vartoti negalima:

- jeigu skrandyje yra opų ar padidėjęs jautrumas širdažolių žolei, gelsvių šaknims, rozmarinų lapams ar vienai iš preparato sudedamųjų dalių;
- jeigu sutrikusi inkstų funkcija;
- sergant inkstų uždegimu;
- esant edemai dėl sutrikusios širdies ar inkstų funkcijos;
- preparato nereikėtų skirti jaunesniems nei 12 metų amžiaus vaikams.

#### **Specialios atsargumo priemonės**

Pastebėjus kraujo šlapime, atsiradus šlapinimosi sutrikimų ir ūmiam šlapimo susilaikymui, reikia nedelsiant pasitarti su gydytoju.

#### **Kitų vaistų vartojimas**

Kol kas nežinoma apie sąveiką su kitais vaistais.

Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

### **Nėštumas ir žindymo laikotarpis**

Kadangi nepakanka duomenų apie vartojimą nėštumo ir žindymo laikotarpiu, vartoti preparatą nėštumo ir žindymo laikotarpiu negalima.

### **Vairavimas ir mechanizmų valdymas**

Nežinoma jokio poveikio gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus.

### **Svarbi informacija apie kai kurias pagalbines Canephron medžiagas**

Šio preparato sudėtyje yra gliukozės, sacharozės ir laktozės. Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą.

Kita informacija

Vienoje Canephron tabletėje yra apie 0.020 duonos vienetų (DV).

## **3. KAIP VARTOTI CANEPHRON**

Canephron visada vartokite, kaip nurodyta šiame pakuotės lapelyje. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Jei nenurodyta kitaip, įprastinė dozė paaugliams nuo 12 metų ir suaugusiems yra:

2 tabletės 3 kartus per parą.

Tabletes gerti nesukramtytas, užgeriant trupučiu skysčio. Reikia vartoti pakankamai skysčių.

Gydymo trukmė.

Gydymo trukmė iš esmės nėra ribojama, tačiau pastebėjus kraujo šlapime, atsiradus šlapinimosi sutrikimų ir ūmiam šlapimo susilaikymui, reikia nedelsiant pasitarti su gydytoju.

Prašome pasitarti su gydytoju arba vaistininku, jei Jums atrodo, kad Canephron poveikis yra per stiprus ar per silpnas.

Jei preparato vartojimas neveiksmingas arba sukelia šalutinį poveikį, nepamirėta ant pakuotės ar pakuotės lapelyje, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

### **Pavartojus per didelę Canephron dozę**

Iki šiol žinomų apsinuodijimų nebuvo.

### **Pamiršus pavartoti Canephron**

Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistąją.

## **4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS**

Canephron, kaip ir visi kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms. Nepageidaujamo poveikio reiškiniams apibūdinti naudojamos šios dažnio kategorijos:

Labai dažni:	daugiau nei 1 iš 10 ligonių
Dažni:	mažiau nei 1 iš 10, bet daugiau nei 1 iš 100 ligonių
Nedažni:	mažiau nei 1 iš 100, bet daugiau nei 1 iš 1000 ligonių
Reti:	mažiau nei 1 iš 1000, bet daugiau nei 1 iš 10 000 ligonių

Labai reti:                      mažiau nei 1 iš 10 000 ligonių, įskaitant pavienius atvejus, dažnis nežinomas (negali būti įvertintas pagal turimus duomenis)
---

Svarbūs nepageidaujamo poveikio reiškiniai ar požymiai, į kuriuos turėtumėte atkreipti dėmesį, ir priemonės, kurių turėtumėte imtis, jei juos pastebėtumėte:

Labai retais atvejais pastebėta alerginių odos reakcijų. Dažnai gali atsirasti skrandžio ir žarnyno sutrikimų (pykinimas, vėmimas, viduriavimas).

Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, nutraukite vaisto vartojimą ir pasakykite gydytojui.

Pasakykite gydytojui arba vaistininkui, jeigu atsirado bet kokių kitų pašalinio poveikio reiškinų.

## 5. KAIP LAIKYTI CANEPHRON

Laikykite vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Ant dėžutės po „Tinka iki“ ar lizdinės plokštelės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, Canephron vartoti negalima. Vaistas tinka vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Vaistų negalima išpilti į kanalizaciją arba išmesti su buitinėmis atliekomis. Kaip tvarkyti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

## 6. KITA INFORMACIJA

### Canephron sudėtis

- Veikliosios medžiagos yra širdažolių žolė, gelsvių šaknys, rozmarinų lapai. 1 tabletėje yra 18 mg *Centaurium erythraea* Rafn s. l., herba (skėtinių širdažolių) žolės, 18 mg *Levisticum officinale* Koch. (vaistinių gelsvių) šaknų, 18 mg *Rosmarinus officinalis* L. (kvapiųjų rozmarinų) lapų.
- Pagalbinės medžiagos. Tabletės branduolys: laktozės monohidratas, magnio stearatas, kukurūzų krakmolas, povidonas K25, bevandenis koloidinis silicio dioksidas. Tabletės dangalas: skystoji gliukozė, džiovinta išpurškiant, kalcio karbonatas, kukurūzų krakmolas, dekstrinas, montanglikolio vaškas, povidonas K30, ricinų aliejus, natūralusis, sacharozė, šelakas, talkas, geležies (III) oksidas (E172), riboflavinai (E101), titano dioksidas (E171).

### Canephron išvaizda ir kiekis pakuotėje

Canephron yra oranžinės spalvos dengtos tabletės.  
Tiekiamos kartono dėžutėse po 60 arba 120 tablečių.  
Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

### Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas

BIONORICA SE  
Kerschensteinerstrasse 11-15  
92318 Neumarkt i.d.Opf.  
Vokietija  
El. paštas: info@bionorica.de

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.

Lietuvos ir Vokietijos UAB  
“Kauno medicinos centras”  
Šiaurės pr. 8a  
LT-49155 Kaunas  
Tel. + 370 37 38 68 30