

## PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

### Tonsilgon N geriamieji lašai, tirpalas

Vaistinių svilarožių šaknys, ramunėlių žiedai, asiūklių žolė, riešutmedžių lapai, paprastųjų kraujažolių žolė, ažuolų žievė, kiaulpienių žolė

#### **Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.**

Tonsilgon N galima įsigyti be recepto, tačiau jį reikia vartoti tiksliai, kaip nurodyta, kad poveikis būtų geriausias.

- Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
- Jeigu norite sužinoti daugiau arba pasitarti, kreipkitės į vaistininką.
- Jeigu simptomai pasunkėjo arba nepalengvėjo, kreipkitės į gydytoją.
- Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

#### **Lapelio turinys**

1. Kas yra Tonsilgon N ir kam jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant Tonsilgon N
3. Kaip vartoti Tonsilgon N
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti Tonsilgon N
6. Kita informacija

### **1. KAS YRA TONSILGON N IR KAM JIS VARTOJAMAS**

Dažnai atsinaujinančios bei lėtinės kvėpavimo takų infekcinės ligos, ypač tonzilių uždegimas (tonzilitas).

### **2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT TONSILGON N**

#### **Tonsilgon N vartoti negalima:**

- jei žinoma, kad yra buvę alerginių reakcijų, kurias sukėlė graižaziedės gėlės ar bet kuri kita Tonsilgon N sudedamoji medžiaga.

#### **Specialios atsargumo priemonės**

Šiame vaistiniame preparate yra 19 tūrio procentų alkoholio, t.y. iki 0,21 g alkoholio 25 lašuose (vienoje suaugusiųjų dozėje), o tai atitinka 5 ml alaus ar 2 ml vyno ir yra žalinga alkoholizmu sergantiems žmonėms. Į tai turi atsižvelgti nėščios ar žindančios moterys, vaikai, vartojantys didesnes dozes nei rekomenduota, ir asmenys, kuriems yra kepenų liga, epilepsija, smegenų liga ar pažeidimas.

#### **Kitų vaistų vartojimas**

Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

#### **Tonsilgon N vartojimas su maistu ir gėrimais**

Duomenys nebūtini.

#### **Nėštumo ir žindymo laikotarpis**

Prieš vartojant bet kokį vaistą būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

Kadangi nepakanka duomenų apie preparato vartojimą nėštumo ir žindymo laikotarpiu, prieš vartojant šį vaistinį preparatą būtina pasitarti su gydytoju, kad jis visapusiškai įvertintų naudą ir riziką.

### **Vairavimas ir mechanizmų valdymas**

Duomenys nebūtinai.

### **Svarbi informacija apie kai kurias pagalbines Tonsilgon N medžiagas**

Šiame vaistiniame preparate yra 19 tūrio procentų alkoholio, t.y. iki 0,21 g alkoholio 25 lašuose (vienoje suaugusiųjų dozėje), o tai atitinka 5 ml alaus ar 2 ml vyno ir yra žalinga alkoholizmu sergantiems žmonėms. Į tai turi atsižvelgti nėščios ar žindančios moterys, vaikai, vartojantys didesnes dozes nei rekomenduota, ir asmenys, kuriems yra kepenų liga, epilepsija, smegenų liga ar pažeidimas.

## **3. KAIP VARTOTI TONSILGON N**

Jeigu gydytojas nenurodė kitaip, rekomenduojama vartoti taip:

### *Ūmūs ligos simptomai:*

Suaugusiems žmonėms - po 25 lašus 5-6 kartus per dieną.

Mokyklinio amžiaus vaikams -po 15 lašų 5-6 kartus per dieną.

Mažiems vaikams -po 10 lašų 5-6 kartus per dieną.

Kūdikiams – po 5 lašus 5-6 kartus per dieną.

Sumažėjus ūmiems ligos simptomams, vaisto dar reikėtų vartoti vieną savaitę.

### *Ūmiems ligos simptomams sumažėjus:*

Suaugusiems žmonėms – po 25 lašus 3 kartus per dieną.

Mokyklinio amžiaus vaikams – po 15 lašų 3 kartus per dieną.

Mažiems vaikams – po 10 lašų 3 kartus per dieną.

Kūdikiams – po 5 lašus 3 kartus per dieną.

### Nurodymas

Vaistus gerti neskiestus. Poveikis stipresnis, jei lašai kurį laiką palaikomi burnoje.

### Ypatingi nurodymai

Lašinant vaistus, buteliuką laikyti vertikaliai. Skystis gali nežymiai susidrumsti, bet jo veiksmingumui tai neturi jokios reikšmės.

### **Pavartojus per didelę Tonsilgon N dozę**

Kreipkitės į gydytoją ar vaistininką.

### **Pamiršus pavartoti Tonsilgon N**

Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę.

### **Nustojus vartoti Tonsilgon N**

Jei kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

## **4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS**

Tonsilgon N, kaip ir visi kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms. Alerginių odos reakcijų yra pasitaikę labai retai.

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, kreipkitės į gydytoją ar vaistininką.

Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui ar vaistininkui.

## 5. KAIP LAIKYTI TONSILGON N

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Laikyti, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos ir drėgmės.

Atidarius buteliuką pirmą kartą tinka vartoti 6 mėnesius.

Ant etiketės ir dėžutės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, Tonsilgon N vartoti negalima. Vaistas tinka vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

## 6. KITA INFORMACIJA

### Tonsilgon N sudėtis

- Veikliosios medžiagos yra:  
100 g tirpalo yra 29 g vandeninio etanolinio ekstrakto iš:

0,4 g vaistinių svilarožių šaknų (*Althaeae radix*);  
0,3 g ramunėlių žiedų (*Chamomillae flos*);  
0,5 g asiūklių žolės (*Equiseti herba*);  
0,4 g riešutmedžių lapų (*Juglandis folium*);  
0,4 g paprastųjų kraujažolių žolės (*Achillea millfolium*);  
0,2 g ažuolų žievės (*Quercus cortex*);  
0,4 g kiaulpienių žolės (*Taraxaci herba*).

Ekstrahentas 59 % etanolis.

- Pagalbinės medžiagos yra etanolis, išgrynintas vanduo.

Tonsilgon N sudėtyje yra 19 % etanolio.

### Tonsilgon N išvaizda ir kiekis pakuotėje

Skaidrus ar šiek tiek drumstas gelsvai rudas ramunėlių kvapo ir skonio skystis.

Tonsilgon N lašai tiekiami buteliukuose su lašintuvu; buteliukai pakuojami į kartonines dėžutes.

Preparatas tiekiamas 50 ml talpos buteliukuose.

### Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas

BIONORICA AG  
Kerschensteinerstrasse 11-15  
D-92318 Neumarkt  
Vokietija  
Tel. +49-9181-23190  
Faksas +49-9181-231265

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.

Lietuvos ir Vokietijos UAB  
“Kauno medicinos centras”  
Šiaures pr. 8a  
LT- 49155 Kaunas  
Lietuva  
Tel: 8 37 38 68 30

**Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2007-11-06**

Naujausia pakuotės lapelio redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) tinklalapyje <http://www.vvkt.lt/>